

ACETAMINOFENO (TYLENOL)

Peso del niño(a)	Miligramos de medicamento según el peso (10–15 mg/kg/dosis) Sin exceder 90mg/kg/día o 4g/día	Suspensión líquida para bebés O niños 160mg/5mL	Masticables suaves para niños 80mg cada uno	Masticable para Jóvenes 160mg cada uno	Fuerza Regular para Adultos 325mg cada uno	Fuerza Extra para Adultos 500mg cada uno
	Dosificar cada 4–6 horas. Máximo de 5 dosis en 24 horas					
6–8 libras	40 mg	1.25 mL	–	–	–	–
9–11 libras	56 mg	1.75 mL	–	–	–	–
12–14 libras	80 mg	2.5 mL	1	–	–	–
15–17 libras	96 mg	3 mL	1	–	–	–
18–20 libras	120 mg	3.75 mL	1½	–	–	–
21–23 libras	136 mg	4.25 mL	1½	–	–	–
24–30 libras	160 mg	5 mL	2	1	½	–
31–35 libras	200 mg	6.25 mL	2½	1	½	–
36–40 libras	240 mg	7.5 mL	3	1½	½	–
41–47 libras	272 mg	8.5 mL	3	1½	½	–
48–52 libras	320 mg	10 mL	4	2	1	–
53–59 libras	360 mg	11.25 mL	4½	2	1	–
60–65 libras	400 mg	12.5 mL	5	2½	1	–
66–71 libras	448 mg	14 mL	5½	2½	1	–
72–80 libras	488 mg	15.25 mL	6	3	1½	–
81–95 libras	544 mg	17 mL	6½	3	1½	1
96+ libras	640 mg	20 mL	8	4	2	1

5mL = 5cc = 1tsp (cucharilla) 15mL = 15cc = 1tbsp (cucharada) Libras (lbs)/2.2=kilogramos (kg). Ejemplo: 10 lbs / 2.2 = 4.545 kg

- Una temperatura de 100.4 F o 38 C o más es fiebre. ¡Una temperatura de **105 F o 40.5 C es una emergencia médica y debe evaluarse de inmediato!**
- Su hijo(a) debe ser visto por un profesional médico si ha tenido fiebre de 100.4 o 40.5 C o más durante 5 días o más.
- Si tiene <6 meses de edad, por el recto y luego la axila son las mejores áreas para medir la fiebre. No necesita sumar o restar grados.

- **La fiebre en un(a) niño(a) de 2 meses o menos es una emergencia médica** y debe evaluarse de inmediato. Su médico de cabecera debe saber si su hijo(a) tiene 3 meses de edad o menos y tiene fiebre.
- No tiene que tratar la fiebre. Si su hijo(a) se siente cómodo, no tiene que darle medicamento.
- Solo administre ½ tableta o masticable si el medicamento tiene como partirse en dos.

**CENTRO DE
TOXICOLOGÍA**

1-800-222-1222